

新冠肺炎： 您需要知道的一切



有关COVID-19 疫苗的信息

记住在接种疫苗后继续戴口罩并洗手！



- **名称：**辉瑞
- **疫苗类型：**mRNA
- **剂量：**2剂间隔21天
- **给药方法：**上臂肌肉注射
- **有效性：**在未感染过的个体中，预防COVID-19的有效性为95%
- **潜在的副作用：**症状通常在接种疫苗后7天内出现，通常是在第二剂后出现，可能包括注射部位疼痛、发红和肿胀，疲劳，头痛，肌肉疼痛，发冷，发烧和恶心。
- **打疫苗适应人群：**16岁以上的人士



- **名称：**莫德纳
- **疫苗类型：**mRNA
- **剂量：**2剂间隔1个月（28天）
- **给药方法：**上臂肌肉注射
- **有效性：**在未感染过的个体中，预防COVID-19的有效性为94.1%
- **潜在的副作用：**症状通常在接种疫苗后7天内出现，通常是在第二剂后出现，可能包括注射部位疼痛、发红和肿胀，疲劳，头痛，肌肉疼痛，发冷，发烧和恶心。
- **打疫苗适应人群：**18岁以上的人



- **名称：**强生
- **疫苗类型：**病毒载体
- **剂量：**1剂
- **给药方法：**上臂肌肉注射
- **有效性：**72%的整体有效性，对严重疾病具有86%的有效性
- **潜在的副作用：**症状通常在接种疫苗后7天内出现，可能包括注射部位疼痛、发红和肿胀，疲劳，头痛，肌肉疼痛，发冷，发烧和恶心。
- **打疫苗适应人群：**18岁以上的人

资料来源：

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html>

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html>

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html>

<https://www.yalemedicine.org/news/covid-19-vaccine-comparison>

扫描此QR码以查找您附近的纽约市疫苗接种点



解决反亚裔暴力问题的 支持与资源

根据加利福尼亚州立大学的仇恨与极端主义研究中心所做的分析，反亚裔仇恨犯罪在2020年增加了近150%，主要集中在纽约市和洛杉矶。



美国亚裔民
众反仇恨社
区资源

在美国各州各种资源的列表



亚裔心理健
康组织

美国亚裔民众社区的心理健康资源，包括美国各州亚裔心理健康治疗师的目录



停止亚裔
仇恨

纽约市人权办公室提供的针对亚裔偏见、歧视和仇恨的解决方法措施

