


COVID-19:


Todo Lo Que Necesitas Saber




INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS DE COVID-19

Recuerda seguir usando la máscara y lavando las manos después de vacunarse

- 
- **Nombre:** Pfizer-BioNTech
 - **Tipo de vacuna:** mRNA
 - **Número de dosis:** 2 dosis administradas con un intervalo de 3 semanas (21 días)
 - **Método de administración:** Inyección en el músculo del brazo
 - **Eficacia:** Tiene una tasa de eficacia del 95 por ciento en prevenir COVID-19 en personas que no han tenido la infección previamente.
 - **Efectos secundarios potenciales:** Los síntomas se presentan típicamente entre 7 días después del recibo de la vacuna, usualmente después de la segunda dosis. Los síntomas pueden incluir dolor, enrojecimiento, tumefacción alrededor del sitio de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor de músculo, resfrío, fiebre, y náusea.
 - **¿Quién es calificado para recibir la vacuna?:** Cualquiera persona que tenga 16 años o más

- 
- **Nombre:** Moderna
 - **Tipo de vacuna:** mRNA
 - **Número de dosis:** 2 dosis administradas con un intervalo de un mes (28 días)
 - **Método de administración:** Inyección en el músculo del brazo
 - **Eficacia:** Tiene una tasa de eficacia del 94.1 por ciento en prevenir COVID-19 en personas que no han tenido la infección previamente.
 - **Efectos secundarios potenciales:** Los síntomas se presentan típicamente entre 7 días después del recibo de la vacuna, usualmente después de la segunda dosis. Los síntomas pueden incluir dolor, enrojecimiento, tumefacción alrededor del sitio de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor de músculo, resfrío, fiebre, y náusea.
 - **¿Quién es calificado para recibir la vacuna?:** Cualquiera persona que tenga 18 años o más

- 
- **Nombre:** Johnson & Johnson
 - **Tipo de vacuna:** Vector viral
 - **Número de dosis:** 1 dosis
 - **Método de administración:** Inyección en el músculo del brazo
 - **Eficacia:** Tiene una tasa de eficacia del 72 por ciento en general y una tasa de eficacia del 86 por ciento contra enfermedad severa.
 - **Efectos secundarios potenciales:** Los síntomas se presentan típicamente entre 7 días después del recibo de la vacuna, usualmente después de la segunda dosis. Los síntomas pueden incluir dolor, enrojecimiento, tumefacción alrededor del sitio de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor de músculo, resfrío, fiebre, y náusea.
 - **¿Quién es calificado para recibir la vacuna?:** Cualquiera persona que tenga 18 años o más

Fuentes:
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html>
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html>
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html>
<https://www.yalemedicine.org/news/covid-19-vaccine-comparison>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA ENCONTRAR EL SITIO NYC DE VACUNACIÓN MÁS CERCANO A TI



Soporte y Recursos Para Abordar a La Violencia Anti-Asiática



Según un análisis conducido por el Centro de Estudio de Odio y Extremismo en la Universidad del Estado de California, los crímenes anti-asiáticos de odio han aumentado por casi 150% en 2020, mayormente en NYC y LA.

Recursos comunitarios para combatir el odio contra la comunidad API

Lista de recursos hecho por una colaboración abierta distribuida, que se puede encontrar en varios estados entre los EEUU



Colectivo de Salud Mental Asiática

Los recursos de la salud mental para las comunidades AAPI, incluyendo un guía telefónica de terapeutas AAPIs



Paran el odio hacia los asiáticos

Herramientas para abordar prejuicio anti-asiático, discriminación, y el odio, provee por la Oficina de Nueva York de Derechos Humanos

